

フルミストとは？

フルミストとは、鼻の中に噴霧するタイプのインフルエンザワクチンです。

活性を低下させたインフルエンザウィルスを鼻腔内に噴霧することで

体内でインフルエンザ感染と類似した環境を作り、インフルエンザウィルスに対する免疫を誘導します。

フルミストと不活化ワクチンの違い

< 優れている点 >

- ・ 通常インフルエンザウィルスが侵入する経路となる鼻腔で免疫を作るため、高い発症予防効果が得られる
- ・ 活性を低下させたウィルスで免疫を作るため、流行しているインフルエンザと異なる株に対しても軽症化してくれる
- ・ 鼻腔内に噴霧するため、疼痛刺激が少ない
- ・ 効果持続が長い

< 注意すべき点 >

- ・ 接種後、軽い感冒様症状(鼻水・咳など)を、約 50%の方で認めます。
また、微熱を含めて発熱を約10%の方で認めます。

接種対象となる方、接種できない方

< 接種対象となる方 >

- ・ 2 歳以上、18 歳以下

< 接種できない方 >

- ・ 2 歳未満の方、19 歳以上の方→有効性が実証されていません
- ・ デュピクセント（アトピー性皮膚炎・喘息などの治療薬）を使用している方
→接種する場合はフルミスト接種前 12 週間以内は休薬が必要、かつフルミスト接種後 4 週間は注射できません
- ・ ミチーガ（スギ花粉症の治療薬）を使用している方
→接種する場合はフルミスト接種前 6 週間以内は休薬が必要、かつフルミスト接種後 4 週間は注射できません
- ・ 5 歳未満で今までに喘鳴を指摘されたことのある方、1 年以内に喘息発作のあった方
- ・ 心疾患、肺疾患・喘息、肝疾患、糖尿病、貧血、神経性疾患など慢性疾患をお持ちの方
- ・ 免疫不全者と接触を持つ方
- ・ アスピリン内服中の方
- ・ 妊婦、または妊娠の可能性のある方
- ・ 重度の卵アレルギーをお持ちの方→卵摂取でアナフィラキシーの既往のある方
- ・ 他、医師が接種不適当と認めた方